Control de Calidad

Certificado

6115 001 011

JABÓN DESINFECTANTE LEMON

Würth España S.A., declara que el producto cumple con la norma UNE-EN 13.697 DE Antisépticos y desinfectantes químicos para la desinfección de superficies y equipos en la industria alimentaria, estando registrado en el Ministerio de Salud y Consumo S.G. Sanidad ambiental y Salud laboral con número 09-20-05459HA.

COMPOSICIÓN

El Jabón Desinfectante Lemon es un producto altamente efectivo. Combina en un sólo concentrado las funciones de limpieza y desinfección. Elimina bacterias, virus y hongos siendo neutro, no-corrosivo, biodegradable y no tóxico.

Es fácil de usar y no irrita la piel a la concentración de uso.

El Jabón Desinfectante Lemon tiene una gran variedad de aplicaciones en la limpieza y la desinfección de utensilios y superficies en la hostelería e industria alimentaria.

CARACTERISTICAS

- Registrado como bactericida en el MSC.

- Eficacia bactericida certificada según norma europea EN13697.

- Acción fungicida y virucida

- Concentrado, se diluye según aplicación. Económico.

- Excelentes propiedades de desengrase y limpieza.

- Producto 2 en 1, limpia y desinfecta a la vez.

Würth Calidad

TÜV ISO 9001

AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96

- pH neutro

- No corrosivo, no tóxico, fácilmente biodegradable.

- Fácil manejo.

APLICACIONES

Desinfectante y limpiador de alta eficacia a bajo coste.

Puede aplicarse en a utensilios alimentarios, vajilla, paredes, suelos, moquetas, áreas de recepción, auriculares de teléfono, paredes, suelos, juguetes, sanitarios, etc, con excelente resultado tanto en limpieza como en desinfección.

MODO DE EMPLEO

Limpieza de zonas no críticas:

Diluir en agua al 1%. Para suelos, aplicar con fregona bien escurrida y dejar secar. En las demás superficies se recomienda pulverizar o mojar la superficie extendiendo con bayeta limpia o tejido de celulosa /viscosa / poliéster de un solo uso (recomendado). Aclarar con agua aquellas superficies o utensilios mediante los cuales puedan entrar en contacto los alimentos con el producto.

Limpieza y desinfección de zonas críticas:

Diluir el producto en agua al 4%. Eliminar siempre primero el exceso de suciedad antes de desinfectar. Para los cubiertos, utensilios y accesorios de procesado de alimentos se recomienda primero cepillar y a continuación, sumergir en la solución de limpiador desinfectante durante un mínimo de 5 minutos, finalmente aclarar con agua y dejar secar.

Para la desinfección de superficies que contactan alimentos, se recomienda pulverizar o aplicar con bayeta nueva o previamente desinfectada. Frotar y dejar actuar 5 minutos, para posteriormente aclarar con agua. Dejar secar o absorber con celulosa de un solo uso.

Industria alimentaria

Desinfección de salas, suelos y paredes. Limpieza y desinfección de utensilios de corte, aparatos de procesado, boquillas de envasado, rejillas, depósitos de almacenaje, etc.

Colectividades

El producto Jabón Desinfectante Lemon eficaz para la desinfección de suelos y paredes en salas de elaboración, cuartos de contenedores de basuras, almacenes de víveres y cámaras de refrigeración de cocinas y comedores colectivos. Así mismo también es eficaz para la desinfección de cubertería, menaje, tablas de corte, superficies en contacto con alimentos, desinfección de aparatos y utensilios para troceado de carnes y vegetales, corte de fiambres, montadoras de nata, batidoras, amasadoras etc.

DATOS TÉCNICOS

Líquido fluido color amarillo

% Glutaraldehido: 2.5%

Tensión superficial (20ºC, 2%) = 28 dinas/cm

PH(20ºC) = 7 – 8

Producto biodegradable, cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.

Control de Calidad

EFECTIVIDAD JABON DESINFECTANTE LEMON (2% Glutaraldehído)

ESPECTRO BIOCIDA EN AGROPECUARIA DE MICROORGANISMOS

(REDUCCIÓN DE 10_6 UFC DE LA CARGA MICROBIANA)

BACTERIAS

NOMBRE	ENFERMEDAD	Concentración de Glutaraldehido	Tiempo de contacto
Haemophillus spp		0.1 %	< 3 min.
Campylobacteria		0.1 %	< 3 min.
Pasteurella spp		0.2 %	< 3 min.
Clostridium spp		0.2 %	< 3 min.
Pseudomonas Aeruginosa		0.2 %	< 3 min.
E Coli		0.1 %	< 3 min.
Staphylococcus Aureus		0.1 %	< 3 min.
Streptococcus		0.1 %	< 3 min.
Mycobacterium TB		2.0 %	< 4 min.
Mycobacterium TB		0.2 %	< 10 min.
Salmonella		0.1 %	< 3 min.
Klebsiella		0.2 %	< 3 min.
Bacillus (esporas)		2.0 %	< 10 min.
Bacillus Subtilis		2.0 %	4 horas

HONGOS

NOMBRE	ENFERMEDAD	Concentración de glutaraldehido	Tiempo de contacto
Trichophyton spp (culebrilla, caballos, perros, gatos, etc.)	Dermatofitos	0.3 %	< 5 min.
Microsporum spp		0.3 %	< 5 min.
Trichophyton Mentagrophytes (caballos, perros y gatos)		0.3 %	< 5 min.
Aspergillus Níger		2.0 %	15 min.
Aspergillus Fumigatus (aves de corral)		0.3 %	< 5 min.
Aspergillus Flavirus		0.3 %	< 5 min.
Scopulariopsis		0.2 %	< 5 min.
Geotrichum Candidum		0.3 %	< 5 min.
Absydia Corymbifera		0.3 %	< 5 min.
Trichosporum Cutaneum		0.3 %	< 5 min.
Trichophyton Verucosum		0.3 %	< 5 min.
Microsporum Canis		0.3 %	< 5 min.

TÜV ISO 9001
AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96

VIRUS

NOMBRE	ENFERMEDAD	Concentración de glutaraldehido	Tiempo de contacto
Avideno Virus	Síndrome de caída de puesta	0.2 %	< 3 min.
Mastadeno Virus ARD (bovino, porcino, ovino,canino y infección hepatitis canina)	Hepatitis	0.2 %	< 3 min.
Adenoviridae-Respiratorio Infección	Infección respiratoria	0.2 %	< 3 min.
Hepadnaviridae-Hepatitis B	Hepatitis B	0.2 %	< 10 min.
Hepadnaviridae-Pato de Pekín	Pato de Pekín	0.2 %	< 10 min.
Hepadnaviridae-Ardilla	Ardilla	0.2 %	< 10 min.
Hepadnaviridae-Canguro	Canguro	0.2 %	< 10 min.
Togaviridae-Pestivirus	Peste porcina clásica, encéfalo mielitis ovina, enfermedad Wesselbron	0.2 %	< 3 min.
Herpetoviridae-Herpesvirus		0.2 %	< 3 min.
Bovino			
- Epstein barr	Mononucleosis infecciosa		
- Rinotraqueitis bovino infecciosa	Rinotraqueitis bovino infecciosa		
- Herpes bovino			
Bovino / Porcino	Herpes bovino (mamitis ulcerativa)		
-Pseudorables			
Porcino	Pseudo (Enfermedad de Aujesky)		
Aves de corral	Citomegatovirus porcino (daño fetal).		
	Enfermedad de Marek		
Caballos	(Laringotraquaitis infecciosa)		
Gatos	Rino Equino (exantema coital equino)		
Iridoviridae –Iridovirus	Herpes felino	0.2 %	< 3 min.
Porcino		0.2 %	< 3 min.
Papoviridae-Papillomavirus	Peste porcino africana	0.2 %	< 3 min.
Bovino			
Caballos	Papilomatorius bovino		
Perros	Papilomatorius equino		
Polymavirus	Papilomatorius canino oral	0.2 %	< 5 min.
Mono (simian virus 40)			
Ratón			
Parvoviridas-Parvovirus	Polioma del ratón	0.2 %	< 5 min.
Bovino			
Porcino	Parvovirosis bovino		
Perros	Parvovirosis porcino		
Gatos	Parvovirosis canina		
Denovirus- Insectos	Parvovirosis felina	0.3 %	< 3 min.
Poxviridae- Parapoxivirus		0.2 %	< 3 min.
Bovino			

TÜV ISO 9001 AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96

Cabra -Capripoxvirus Cabra / Oveja -Goat pox	Pseudoviruela Viruela caprina		
Pájaros -Avipoxivirus			
Ave de corral -Fowl pox -Leporipox virus	Viruela aviar		
Conejo -Mixomatosis -Entomopoxvirus	Mixomatosis		
Insectos -Poxviruses			
Ratón Oveja Bovino	Ectromelia Ectima		
-Papular stomatits -Zlymoy shin desease -Ulcerativa dermatosis	Estomatitis popular Enfermedad de Dermatitis ulcerativa	0.2 %	< 5 min.
Arenavirus Rata	Cromiomeningitis linfático	0.2 %	< 5 min.
Bunyavirus Oveja Conejo	Enfermedad de Nairobi ovino Encefalitis californiano (transmitida por insectos)	0.2 %	< 5 min.
Coronaviridae Bovino Porcino	Diarrea neonatal del ternero Gastroenteritis transmisible, TGE Enfermedad del vómito y el agotamiento		
Aves de corral Ratón Perro	Bronquitis infecciosa Hepatitis del ratón Coronavirus canino	0.2 %	< 3 min.
Orthomyxoviridae Bovino / Porcino Porcino Equino	Influenza A Influenza porcina Influenza	0.2 %	< 5 min.
Aves de corral Paramyxovirus Bovino Rumiante	Influenza aviar Peste bovina Peste de los pequeños rumiantes	0.2 %	< 3 min.
Aves de corral Moribillivirus	Enfermedad de New Castle	0.2 %	< 3 min.
Perros Pneumovirus TRT	Moquillo	0.2 %	< 3 min.
Pavo Picomaviridae-Enterovirus	Rinotraqueitis		
Bovino Porcino	Enterovirus bovino Enterovirus porcino	0.2 %	< 3 min.

TÜV ISO 9001
AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96

	Enfermedad vesicular porcina		
Rhinovirus -Foot & mouth desease of cloven hoofed animals	Fiebre aftosa		
Bovino / Oveja / Cabra			
Caballos	Rinovirus equino		
Porcino	Enfermedad de Teshen (encéfalo mielitis)		
Pájaros	Encéfalo mielitis aviar		
Rata	Encéfalo mielitis de la rata		
		0.2 %	< 5 min.
Calicivirus			
Porcino	Exantema vesicular	0.2 %	< 5 min.
Gatos	Calicivirus felino		
Reovirus			
Ciervos	Hemorragia epizoótica		
Bovino	Ibaraki		
Aves de corral	Tenosynovitis	0.1 %	< 3 min.
Pato	Arteritis viral aviar		
Rotavirus			
Ternero / porcino	Diarrea		
Ave de corral / gumboro / IBD	Enfermedad de Gumboro, IBD Enfermedad bursal infecciosa	0.2 %	< 3 min.
Orbivirus			
Oveja	Lengua azul	0.2 %	< 3 min.
Caballos	Fiebre africana equina		
Retroviridae			
Bovino, gatos & rata	Leucemia		
Bovino, gatos			
-Oncovirus Sarcoma	Sarcoma Oncovirus		
Pollos			
-Oncovirus Rous Sarcoma, Leukosis	Sarcoma de Rous, leucosis	0.1 %	< 5 min.
Lentivirus			
Oveja		0.2 %	< 5 min.
Cabras	Encefalitis artrítica	0.2 %	< 5 min.
Spumavirus			
Bovino	Virus sincial bovino	0.2 %	< 5 min.
Rhabdoviridae-Lyssavirus	Rabia		
Bovino / Porcino	Estomatitis vesicular		
Rubivirus	Diarrea viral bovina		
Bovino	Encefalitis		
Equino	Arteritis equina		

TÜV ISO 9001
AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es un desinfectante sólo para uso profesional y para aplicación no medicamentosa.

Se recomienda el uso de guantes cuando se manipule el Jabón Desinfectante Lemon en la forma concentrada.

En caso de contacto con piel u ojos, enjuagar a continuación con agua abundante.

Debido a su estabilidad y dilución, el Jabón Desinfectante Lemon no es un producto peligroso si se utiliza siguiendo las instrucciones de uso.

Antes de utilizar el producto por primera vez leer las instrucciones de la *HOJA DE SEGURIDAD*.

Registro fabricante de plaguicidas WÜRTH ESPAÑA, S.A. : B-0304-E

Registro Sanitario Industrial: 09-20-05459

Würth España S.A
Dpto. Control de Calidad.

TÜV ISO 9001
AENOR ER Empresa Registrada ER-041/1/96